

Włośnica

Włośnica jest to choroba inwazyjna, odzwierzęca spowodowana spożyciem larw nicieni z rodzaju *Trichinella*. Choroba ta może przebiegać bezobjawowo lub poronnie do przypadków ciężkich i śmiertelnych włącznie.

Od spożycia zakażonego mięsa do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych upływa 1 do 45 dni, zwykle około 10-14 dni. W przypadkach objawowych choroba rozpoczyna się często zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, gorączką, bólami mięśni oraz obrzękami twarzy a zwłaszcza powiek. W końcowej fazie zarażenia się człowieka larwy rozprzestrzeniają się po całym organizmie i zagnieżdżają się w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Tam ulegają otorbieniu i w takich warunkach mogą przeżyć nawet kilkanaście lat.

Do zarażenia człowieka dochodzi na skutek spożycia mięsa i jego przetworów zawierających otorbione larwy włośnica krętego. W Polsce najczęstszym źródłem zarażenia jest mięso wieprzowe i dzików, choć należy brać pod uwagę także inne gatunki mięsa.

W ostatnich latach w powiatach ościennych miały miejsce liczne ogniska tej choroby, przyczyną było spożycie zakażonego mięsa upolowanych dzików.

Zagrożenie zatem jest realne i dlatego w zapobieganiu zarażeniu się włośnicą należy:

1. Pamiętać, że bezpieczne jest tylko mięso pochodzące z pewnego źródła, które było poddane badaniu poubojowemu na obecność larw włośni (takie mięso kupujemy w sklepach).
2. Wystrzegać się wyrobów z dziczyzny niewiadomego pochodzenia – w woj. wielkopolskim na 10 zarejestrowanych w latach 1999-2005 ognisk włośnicy, w 9 przypadkach było to właśnie mięso dzika.
3. Unikać spożywania mięsa i jego przetworów w postaci surowej lub niedogotowanej np. befsztyku tatarskiego.
4. Hodowcy powinny przestrzegać odpowiedniego poziomu sanitarnego hodowli i higieny karmienia zwierząt. Nie wolno karmić świń surowymi odpadami mięsnymi lub padliną, a ферmy chronić przed zaszczurzeniem.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

mgr farm. Paweł Gilewski
Specjalista Higieny i Epidemiologii